



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W WEJHEROWIE

Wioletta Drygas-Bogucka

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.15.4315.2.2020

Dot. sprawy nr:

-

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, informuje, że na terenie Polski potwierdzane są kolejne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Na dzień dzisiejszy potwierdzonych jest 8 ognisk choroby w województwach: lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz 1 wystąpienie choroby u dzikiego ptactwa.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przypomina o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków również na terenie powiatu wejherowskiego.

Choroba charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istnieją również potwierdzone informacje, że choroba cechuje się niską śmiertelnością, ale jednocześnie wysokim stopniem rozprzestrzeniania się. W związku z powyższym proszę zadbać o odpowiednie zabezpieczenie paszy, ściółki oraz drobiu przed dzikimi ptakami wędrownymi, które są wektorem wirusa HPAI.

Obowiązujące zasady bioasekuracji określa **rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)**.

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:

Zaleca się:

- rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermach;
- unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwej@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- ograniczenie liczby osób obsługujących fermę do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
- rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy;
- sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych w/w zabiegów;
- obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami;
- niezwłoczne informowanie powiatowych lekarzy weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej;
- zgłaszanie w powiatowych inspektoratach weterynarii zamiaru przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Informacje dla drobnotowarowych hodowców drobiu-chów przyzagrodowy

Zaleca się:

- nie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

- unikanie czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu (a w takich przypadkach zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa biologicznego).

Informacje dla hodowców gołębi pocztowych:

Zaleca się:

- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia chorobą oraz konsekwencje prawne.

Nieprzestrzeganie zakazów i nakazów określonych w w/w rozporządzeniu MRiRW wiąże się z konsekwencjami prawnymi i jest zagrożone karą pieniężną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie powyższych informacji drogą zwyczajowo przyjętą zgodnie z właściwością terytorialną.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wejherowie
lek. wet. Joanna Wasilewska

Załącznik:

Ulotka informacyjna- zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo
tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwej@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
2. Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
3. Urząd Gminy Linia ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
4. Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
5. Urząd Gminy Łęczyce ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce
6. Urząd Miasta Reda ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
7. Urząd Miasta Rumia ul. Jana III Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
8. Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
9. Urząd Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
10. Urząd Miasta Wejherowo ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
11. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego ul. Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo
12. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Wł. Sikorskiego 60, 84-200 Wejherowo



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo


tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

HODOWCO

PAMIĘTAJ!!!

Za drób zabity, poddany ubojowi oraz padły w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI przystępuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi HPAI wysoce zjadliwa grypa ptaków narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, mięsa drobiowego, jaj oraz produktów pozyskiwanych od drobiu, a także padnięciami drobiu i kosztami likwidacji ognisk choroby HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU DOTYCZĄCA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW HPAI



ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo
tel.: (58) 672-18-60,
fax: (58) 677-09-71,
e-mail:
piwwejh@ggdansk.wiw.gov.pl

Jak rozpoznać HPAI - wysoce zjadliwą grypę ptaków?

Podstawowe objawy:

-osowiałość, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, kichanie duszność, obrzęk zatok podczołowych, objawy nerwowe, biegunka, nagłe upadki zwierząt bez widocznych objawów, śmiertelność do 100%.

Rozprzestrzenianie choroby:

- zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi,
- wirus rozprzestrzenia się przez zakażoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt, środki transportu i człowieka (obuwie, ubranie, sprzęt, produkty zwierzęce (jaja drobiu).

Jak zapobiegać HPAI?

Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła HPAI lub brały udział w polowaniach na ptaki dzikie migrujące;

Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się ptaków dzikich, zabezpieczyć paszę i wodę przed dostępem ptaków wolno żyjących;

Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt;

Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiegokolwiek objawy osłabienia;

Co to jest HPAI - wysoce zjadliwa grypa ptaków?

Wysoce zjadliwa grypa ptaków-HPAI- to szybko szerząca się choroba wirusowa, zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez **wirus**, na którą podatny jest drób domowy oraz ptaki dzikie.

Ludzie są wrażliwi na zakażenie wirusem HPAI w związku, z czym choroba ta stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa HPAI do kraju wolnego od choroby następuje poprzez **transport drobiu żywego i jaj pochodzących ze stad zakażonych oraz ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza ptaki wodne migrujące.**

Najczęstszą przyczyną zakażenia drobiu jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub pośrednio przez zakażoną paszę, wodę, sprzęt, transport i człowieka.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących drób, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

W 2014 i 2015 roku HPAI wykryto w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i we Włoszech.

Podejrzasz wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podlegające zakażeniu lub chorobie.

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

